

Tab.21 : Nombre et pourcentage* de résistance et de sensibilité de *S. pneumoniae* aux antibiotiques dans le LCS (année 2022)

| Antibiotiques | Réseau | | | IPA | | |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|------|-------|
| | R | I | S | R | I | S |
| PEN (CMI) | 20/25 | 0/25 | 5/25 | 17/20 | 0/20 | 3/20 |
| CTX (CMI) | 1/22 | 5/22 | 16/22 | 0/20 | 1/20 | 19/20 |
| IPM (CMI) | 0/25 | 2/25 | 23/25 | 1/20 | 5/20 | 14/20 |
| ERY | 24/44 54,54% | 2/44 4,54% | 18/44 40,90% | 11/20 | 1/20 | 8/20 |
| CLI | 13/33 39,39% | 3/33 9,09% | 17/33 51,51% | 9/20 | 0/20 | 11/20 |
| QDA | 0/5 | 1/5 | 4/5 | NT | NT | NT |
| CHL | 1/30 3,33% | 0/30 0% | 29/30 87,87% | 0/20 | 0/20 | 20/20 |
| RIF | 0/27 | 0/27 | 27/27 | 0/20 | 0/20 | 20/20 |
| SXT | 12/40 30% | 2/40 5% | 26/40 65% | 6/18 | 0/18 | 12/18 |
| VAN | 0/36 0% | 0/36 0% | 36/36 100% | 0/20 | 0/20 | 20/20 |
| LVX | 0/36 0% | 1/36 2,77% | 35/36 97,22% | 0/12 | 0/12 | 12/12 |
| DOX | 4/13 | 0/13 | 9/13 | 10/20 | 1/20 | 9/20 |
| FOS (50µg) | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/19 | 0/19 | 19/19 |
| GEM | NT | NT | NT | NT | NT | NT |

Abréviations : PEN (pénicilline), CTX (céfotaxime), IPM (imipénème), ERY (érythromycine), CLI (clindamycine), QDA (quinupristine- dalfopristine), CHL (chloramphénicol), RIF (rifampicine), SXT (cotrimoxazole), VAN (vancomycine), LVX (lévofloxacine), DOX (doxycycline), FOS (fosfomycine), GEM (gémifloxacine), CMI (concentration minimale inhibitrice), R (Résistant), I (intermédiaire), S (sensible), NT (non testé).

* Les pourcentages ne sont pas calculés pour des effectifs inférieurs à 30.